

Digestie



CARE

OMSCHRIJVING

Combinatie van regelaars van maagzuur en L-glutamine.
Draagt bij aan de preventie en de genezing van maagzweren bij het paard.

INDICATIES

Preventie van maagzweren.

REVERDY CARE kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- vermoeden van maagzweren bij gestreste paarden,
- stress veroorzakende omstandigheden:
 - › langdurig transport,
 - › intensieve trainingsfase,
 - › voorbereiding op de verkoop van yearlings / veilingen
 - › enz.
- aangetoonde aanwezigheid van maagzweren, als aanvulling op een aangepaste voeding.

GEBRUIKSADVIEZEN

Goed met het krachtvoer mengen.
De dagelijkse dosis over alle maaltijden verdelen.
1 maatbeker = 45 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Preventieve dosis	1 maatbeker (45 g) ofwel 9 g /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	2 maatbekers (90 g) ofwel 18 g /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.



1,6 kg

5,5 kg

**Afwezigheid van Naturally Occurring Prohibited Substances (NOPS), in overeenstemming met de voorschriften van de Racing Codes, de FEI, de FFE en de SHF.*



Poeder

SAMENSTELLING

Lithothamnium (Phymatolithon calcareum), FOScc (Korte keten fructo-oligosachariden), natuurlijk groene appelaroma.

PER KG

L-glutamine 200.000 mg
Zink (sulfaat) 4.445 mg

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Vocht 2%
Totale eiwitten 23%
Ruwe celstof <0,3%
As 42%
Calcium 13%
Natrium 0,3%

1 MAATBEKER (45 G) CARE BEVAT :

20.000 mg lithothamnium, 13.000 mg FOScc, 9.000 mg L-glutamine en 200 mg zink.

EIGENSCHAPPEN

Lithothamnium is een kalkhoudende zeealg met een sponsachtige structuur die doet denken aan een honingraat. Dit bijzondere kenmerk verklaart zijn belangrijke en langdurige bufferwerking in de tijd in een zuur milieu. De werkzaamheid hiervan bij het neutraliseren van de zure afscheidingen van de maag werd gevalideerd voor paarden. Door de inname van lithothamnium van dezelfde kwaliteit als die in de CARE en in hoeveelheid gelijk aan 2 maatbekers per dag gedurende 30 dagen konden de zweren bij de paarden van het onderzoek aanzienlijk verminderd worden.

Er is aangetoond dat de FOScc de zuurtegraad van de maaginhoud van het paard verminderen. Als prebiotica verhogen zij de hoeveelheid darmflora en de activiteit hiervan, die melkzuur gebruikt.

L-glutamine is een belangrijke energiebron voor snel vernieuwende cellen, zoals die van het maag- darmkanaal. Dit aminozuur helpt dus bij de instandhouding van de integriteit van het maagslijmvlies en de heling van zweren.

Zinksulfaat zou bijdragen aan een snelle en langdurige afremming van de zure afscheidingen van de maag.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.

