


QUELS SONT LES FACTEURS QUI FONT VARIER LA QUANTITÉ DE SUCRES DANS L'HERBE ?



REVERDY



Avantages de la pâture




Problématique




Y-A-T-IL DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS POUR SORTIR SON CHEVAL AU PRÉ ?



Une étude réalisée aux USA a montré que : **LA CONCENTRATION EN SUCRES SOLUBLES** (fructanes + glucose + fructose + saccharose) est plus élevée :




POURQUOI ?




Risque de fourbure + élevé au début du Printemps et diminue avec l'arrivée de l'été.

Pourquoi ? En prévision de la pousse, l'herbe stocke de l'énergie sous forme de fructoses. Dès que les T° augmentent -> l'herbe pousse et utilise ses ressources.





Certains chevaux sont capables d'augmenter leur consommation d'herbe s'ils se sentent restreints ! Donc pour un cheval à risque pendant période à risque : plutôt le sortir au pré avec un panier de pâturage.

Le jour : l'herbe produit et stocke des sucres (grâce à la photosynthèse). La nuit : l'herbe utilise ses réserves pour continuer à pousser (ssi T° >15°C).
Conseil pratique : Faire pâturer les chevaux à risque le matin.



CE QUI OBSERVÉ AU PRINTEMPS EST ÉGALEMENT OBSERVÉ À L'AUTOMNE



L'étude a aussi montré que le foin issu de ces pâtures n'est pas moins riche en sucres que l'herbe fraîche !

Faire tremper le foin au moins 2h avant de le distribuer aux chevaux à risque (obèses, résistants à l'insuline, syndrome métabolique équin ou syndrome de Cushing).

À SAVOIR :

La quantité de sucres solubles augmente en cas de :

- Fort ensoleillement
- Manque en eau
- Sol trop pauvre en matière organique
- Gel mais beau temps
- Herbe est surpâturée

La quantité de sucres solubles diminue en cas de :

- Faible ensoleillement
- En fonction des espèces semées et/ou se trouvant naturellement dans les prés
- En fonction des variétés au sein de certaines espèces.

