



SYMPTÔMES

RESPIRATION DIFFICILE

Au travail
Au repos

EXCÈS DE MUCUS DANS
LES VOIES RESPIRATOIRES

INFLAMMATION DES VOIES
RESPIRATOIRES

↑ neutrophiles, éosinophiles
et mastocytes

↑ très importante
neutrophiles (>20%)

TOUX

Peu importante
Très importante

DEUX TYPES D'ASTHMES

Modéré (jeunes chevaux)

Baisse de performance

Sévère (>7 ans)

Exercice physique impossible


FACTEURS PREDISPOSANTS



Champignons et
moisissures



Endotoxines




Beta-glucanes



Débris d'acariens




Gaz nocifs



Poussières
inorganiques



Débris végétaux




Particules
ultrafines

COMMENT LIMITER LA POUSSIÈRE DANS L'ENVIRONNEMENT DU CHEVAL ?

LOGEMENT

SI POSSIBLE, LAISSER LE CHEVAL EN PÂTURE 24H/24



Attention au surpâturage, l'absence d'herbe rend la pâture très poussiéreuse par jour sec, cela doit être évité pour les chevaux asthmatiques.

SI LE CHEVAL EST LOGÉ AU BOX



Préférer une litière en
copeaux de bois sans
poussière



Ne pas laisser les chevaux à l'écurie
lorsque les boxes sont nettoyés et lorsque
le fourrage est distribué
Eviter les pics de chaleur dans les écuries



Ventilation adéquate
(naturelle et/ou méca-
nique)

ALIMENTATION



- Choisir un enrubanné de bonne qualité (pas de moisissures, pas de poussières) ou du foin trempé (15-30min) ou vaporisé (Haygain)



- Distribuer le fourrage au sol car il y a plus de poussière s'il est distribué dans un filet à foin suspendu

Changer le fourrage a un meilleur effet que changer la litière, mais changer les deux est la méthode la plus efficace pour limiter les poussières

STOCKAGE

Stocker fourrage et litière loin des chevaux (surtout pas dans l'écurie)